

腎細胞がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
テムシロリムス	テムシロリムス	25mg/body	60分	Day1	7日	最小度
ニボルマブ+イピリムマブ	ニボルマブ	240mg/body	30分	Day1	21日	最小度
	イピリムマブ	1mg/kg	30分	Day1		
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	30分	Day1	14日	最小度
アベルマブ+アキシチニブ	アベルマブ	10mg/kg	60分	Day1	14日	軽度
	アキシチニブ	10mg/回	内服	連日		
ペムブロリズマブ+アキシチニブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	Day1	21日	軽度
	アキシチニブ	10mg/回	内服	連日		
ペムブロリズマブ+レンバチニブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	Day1	21日	中等度
	レンバチニブ	20mg/回	内服	連日		
ニボルマブ (2週) +カボザンチニブ	ニボルマブ	240mg/body	30分	Day1	14日	軽度
	カボザンチニブ	40mg/body	内服	連日		
ニボルマブ (4週) +カボザンチニブ	ニボルマブ	480mg/body	30分	Day1	28日	軽度
	カボザンチニブ	40mg/body	内服	連日		