

# 食道がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
5-FU+CDDP	5-フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1~5	28日	高度
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
術前5-FU+CDDP	5-フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1~5	21日	高度
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
5-FU+CDDP+RT	5-フルオロウラシル	700mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1~4	28日	高度
	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
CDGP+5-FU	5-フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1~5	28日	中等度
	ネダプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
DTX	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	21日	軽度
Weekly PTX	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1,8,15,22,29,36	49日	軽度
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	30分	Day1	14日	最小度
FP+ペムブロリズマブ	5-フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1~5	21日	高度
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	Day1		
5-FU+ペムブロリズマブ	5-フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1~5	21日	軽度
	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	Day1		
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	Day1	21日	最小度
術前DTX+5-FU+CDDP	5-フルオロウラシル	750mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1~5	21日	高度
	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1		