

# 内視鏡治療における抗血栓薬 多剤併用症例の休薬方法

◎休薬期間は検査・治療当日を含まない

併用療法	分類					
	アスピリン	チエノピリジン系	他の抗血小板薬	ワルファリン	DOAC リクシアナ、エリキュース ブラザキサ、イグザレルト	ブリリント
2 剤	休薬なし	5日間休薬				
	休薬なし		1日間休薬			
	休薬なし			休薬なし 治療域 ※1		
	休薬なし				前日の朝まで内服	
	休薬なし					5日間休薬
		アスピリン又は シロスタゾール置換 (5日間)	1日間休薬			
		アスピリン又は シロスタゾール置換 (5日間)		休薬なし 治療域 ※1		
		アスピリン又は シロスタゾール置換 (5日間)			前日の朝まで内服	
			1日間休薬 ※ シロスタゾールは継続	休薬なし 治療域 ※1		
			1日間休薬 ※ シロスタゾールは継続		前日の朝まで内服	
3 剤	休薬なし	5日間休薬		休薬なし 治療域 ※1		
	休薬なし	5日間休薬			前日の朝まで内服	
	休薬なし		1日間休薬	休薬なし 治療域 ※1		
	休薬なし		1日間休薬		前日の朝まで内服	
	休薬なし		1日間休薬			5日間休薬
	休薬なし			休薬なし 治療域 ※1		5日間休薬
	休薬なし				前日の朝まで内服	5日間休薬
		アスピリン又は シロスタゾール置換 (5日間)	1日間休薬	休薬なし 治療域 ※1		
		アスピリン又は シロスタゾール置換 (5日間)	1日間休薬		前日の朝まで内服	

※1 PT-INR については当日測定し、治療域：PT-INR 3.0 以下であることを確認する。

2023年7月20日 改訂