



# 薬剂委员会结果报告



2024年5月1日 開催

➤ 薬剂マスタ登録: 5月9日予定



# 新規採用医薬品

商品名	アイラミド配合懸濁性点眼液		
成分名	ブリモニジン酒石酸塩・布林ゾラミド	薬価	441.7円/ml
メーカー	千寿製薬株式会社		2,208.5円/1本
効能・効果	緑内障・高眼圧症		
用法・用量	1回1滴、1日2回点眼する		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		PTP・包装写真
使用成績調査等対象品目	なし		流通備考 なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:重篤な腎障害のある患者には投与しないこと。</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li> <li>✓ その他:なし</li> </ul>		



# 新規採用医薬品

商品名	ブコラム口腔用液 2.5mg、5mg		
成分名	ミダゾラム	薬価	2.5mg: 1,688.70円/筒
メーカー	武田薬品工業株式会社		5mg: 2,966.70円/筒
効能・効果	てんかん重積状態		
用法・用量	通常、修正在胎52週(在胎週数+出生後週数)以上1歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回2.5mg、1歳以上5歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回5mg、5歳以上10歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回7.5mg、10歳以上18歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回10mgを頬粘膜投与する		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		PTP・包装写真
使用成績調査等対象品目	なし	流通備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項: 重度の肝機能障害患者(Child-Pugh分類C)、中等度又は軽度の肝機能障害患者に対して、中枢神経系への作用が増強又は遷延するおそれがある。</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項: 慢性腎不全を有する患者に対して、中枢神経系への作用が増強又は遷延するおそれがある。</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項: ふた部分を上にして立てて保存してください</li> <li>✓ レセプト上の注意事項: なし</li> <li>✓ その他: 向精神薬であるため、1回14日分を限度とした投薬しか認められない</li> </ul>		



# 新規採用医薬品

商品名	モイゼルト軟膏 1%		
成分名	ジファミラスト	薬価	150.4円/g
メーカー	大塚製薬株式会社		1,504円/本
効能・効果	アトピー性皮膚炎		
用法・用量	通常、成人には1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。 通常、小児には0.3%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。症状に応じて、1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布することができる。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		PTP・包装写真
使用成績調査等対象品目	皮膚感染症のリスクに対して製造販売後データベース調査を実施中	流通備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:基剤中に微細な液滴として分散した液滴分散系軟膏であり、他剤と混合することにより液滴が合一して大きくなるため、他剤と混合不可</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li> <li>✓ 取扱い上の注意:なし</li> <li>✓ その他:なし</li> </ul>		

# 新規採用医薬品(院外採用)

商品名	ゾコーバ錠 125mg		
成分名	エンシトレルビル フマル酸	薬価	7407.40円/錠
メーカー	塩野義製薬株式会社		
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症		
用法・用量	通常、12歳以上の小児及び成人にはエンシトレルビルとして1日目は375mgを、2日目から5日目は125mgを1日1回経口投与する。		
分類	劇薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		PTP・包装写真
粉砕	不可 不可の場合理由: 該当資料なし	分包	可
使用成績調査等対象品目	なし	流通備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項: 肝機能障害のある患者で、コルヒチンを投与中の患者は禁忌</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項: 腎機能障害のある患者で、コルヒチンを投与中の患者は禁忌</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項: 本剤は併用薬剤と相互作用を起こすことがあるため、服薬中のすべての薬剤を確認すること。</li> <li>✓ レセプト上の注意事項: なし</li> <li>✓ その他: 妊婦又は妊娠している可能性のある女性は禁忌</li> </ul>		

# 新規採用医薬品(院外採用)

商品名	エストラジオール錠 0.5mg「F」		
成分名 メーカー	エストラジオール 富士製薬工業	薬価	22.10円／錠
効能・効果	○更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う下記症状 血管運動神経症状(Hot flush及び発汗)、腔萎縮症状、○閉経後骨粗鬆症、○生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整、○凍結融解胚移植におけるホルモン補充周期		
用法・用量	○更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う症状)通常、成人に対しエストラジオールとして1日1回0.5mgを経口投与する。なお、増量する場合は、エストラジオールとして1日1回1.0mgを経口投与することができる。 <閉経後骨粗鬆症)通常、成人に対しエストラジオールとして1日1回1.0mgを経口投与する。 <生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整) 通常、エストラジオールとして1日1回0.5又は1.0mgを21～28日間経口投与し、投与期間の後半に黄体ホルモン剤を併用する。 <凍結融解胚移植におけるホルモン補充周期)通常、エストラジオールとして1日0.5～4.5mgを経口投与し、子宮内膜の十分な肥厚が得られた時点で、黄体ホルモン剤の併用を開始して、妊娠8週まで本剤の投与を継続する。なお、1回投与量は2.0mgを超えないこと。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
粉砕	可	分包	可
使用成績調査等対象品目	なし	流通備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項: 重篤な肝障害のある患者には投与しないこと。</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項: なし</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項: なし</li> <li>✓ レセプト上の注意事項: なし</li> <li>✓ その他: なし</li> </ul>		

# 新規採用医薬品(仮採用)

商品名	フォシーガ錠 10mg		
成分名	ダパグリフロジンプロピレングリコール	薬価	250.70円/錠
メーカー	アストラゼネカ株式会社/小野薬品工業株式会社		
効能・効果	2型糖尿病、1型糖尿病、慢性心不全(ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る) 慢性腎臓病(ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く)		
用法・用量	2型糖尿病:1日1回5mgを経口投与。効果不十分な場合には1日1回10mgに増量可 1型糖尿病:インスリン製剤との併用において1日1回5mgを経口投与。効果不十分な場合1日1回10mgに増量可 慢性心不全:1日1回10mgを経口投与 慢性腎臓病:1日1回10mgを経口投与		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		PTP・包装写真
粉砕	可	分包	可
使用成績調査等対象品目	なし	流通備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:重度の肝機能障害のある患者を対象とした臨床試験は実施していない。</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:【1型・2型糖尿病】eGFR45mL/min/1.73m2未満に低下した患者では効果が十分に得られない可能性がある。</li> <li>✓ 【慢性心不全】eGFR: 25mL/min/1.73m2未満の患者では、投与の必要性を慎重に判断すること</li> <li>✓ 【慢性腎臓病】eGFR: 25mL/min/1.73m2未満の患者では、投与の必要性を慎重に判断すること</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li> <li>✓ その他:なし</li> </ul>		



## 検討事項およびその他の報告

### ① 院内採用品の切替について

採用中止医薬品	切替医薬品
ゾビラックス軟膏 5%	アシクロビル軟膏 5%「ラクール」
ミダゾラム注 10mg「サンド」	ミダゾラム注射液 10mg「NIG」

### ② 院内採用品の削除について

薬剤名	メサラジン腸溶錠 400mg「サワイ」（成分名：メサラジン）
薬剤名	アレビアチン注 250mg （成分名：フェニトインナトリウム）
薬剤名	シーブリ吸入用カプセル 50 $\mu$ g （成分名：グリコピロニウム臭化物）
薬剤名	スピリーバ吸入用カプセル 18 $\mu$ g （成分名：チオトロピウム臭化物）