# 薬剤委員会結果報告

2024年10月2日 開催

➤ 薬剤マスタ登録:10月10日予定

# 新規採用申請医薬品

|                 | AND TO SELECT THE SECOND SECON |            |  |  |  |
|-----------------|--|------------|--|--|--|
| 商品名             | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液<br>1%「東豊」   |            |  |  |  |
| 成分名             | クロルヘキシジングルコン酸塩   | 薬価         | 薬価基準未収載  |  |  |
| \ \ <b>X</b>    | 製造販売元:東豊薬品株式会社<br>発売元:吉田製薬株式会社   | <b>米</b> 仙 |  |  |  |
| 効能•効果           | 手指・皮膚の消毒   | 指・皮膚の消毒    |  |  |  |
| 用法•用量           | 手指・皮膚の消毒には、洗浄後、1日数回適量を塗布する   |            |  |  |  |
| 分類              | 普通薬  | 保管条件       | 室温保存   |  |  |
| 製剤写真            | 10<br>10<br>10   |            | A COMMENT OF THE PARTY OF THE P |  |  |
|                 | 本体写真   |            | PTP·包装写真   |  |  |
| 使用成績調査<br>等対象品目 | なし   | 流通<br>備考   | なし   |  |  |
| 特記事項            | ✓ 肝機能障害時の注意事項:なし<br>✓ 腎機能障害時の注意事項:なし   |            |  |  |  |
|                 | ✓ 調剤・調製に関する注意事項:本剤は希釈せず、原液のまま使用すること  |            |  |  |  |
|                 | ✓ レセプト上の注意事項:なし  |            |  |  |  |
|                 | ✓ その他:本剤は遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存する  |            |  |  |  |
|                 | 代替削除品はマスキンR・エタノール液   |            |  |  |  |

# 新規採用申請医薬品(院外採用)

| 商品名                  | 小児用レルベア50エリプタ30吸入用   |  |              |  |
|----------------------|--|--|--------------|--|
| 成分名<br>メ <b>ー</b> カー | ビランテロールトリフェニル酢酸塩<br>フルチカゾンフランカルボン酸エステル<br>GSK  | 薬価   | 4,846.8円/キット |  |
|                      |  |  | <br>         |  |
| <u> </u>             | 気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)  |  |              |  |
| 用法・用量                | 通常、5歳以上12歳未満の小児には小児用レルベア50エリプタ1吸入(ビランテロールとして25 $\mu$ g及びフルチカゾンフランカルボン酸エステルとして50 $\mu$ g)を1日1回吸入投与する。   |  |              |  |
| 分類                   | 普通薬  | 保管条件   | 室温保存         |  |
| 製剤写真                 | SOURCE LINE TO SOURCE | SO MALE TO THE PARTY OF THE PAR |              |  |
|                      | 本体写真   |  | 包装写真         |  |
| 使用成績調査<br>等対象品目      | なし   | 流通<br>備考   | なし           |  |
| 特記事項                 | <ul> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:本剤の血中濃度が増加し、全身性の作用が発現する可能性が高くなるおそれがある</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li> <li>✓ その他:本剤吸入後にうがいを実施するよう患者、保護者又はそれに代わり得る適切な者を指導すること(口腔咽頭カンジダ症又は嗄声の予防のため)。ただしうがいが困難な患者には、うがいではなく口腔内をすすぐよう指導すること</li> </ul>   |  |              |  |

## 製造中止•回収•出荷調整等情報

| 医薬品名                    | 【内容】理由                           | 今後の対応                         |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| (院外採用) シュアポスト錠<br>0.5mg | ∤栄 貝 フハ 豆 1人 イタ ) /ゴl、 \ プー イタ ) | 本剤マスタを停止、一般名処方で入力するよう該当医師に連絡済 |

### 検討事項およびその他の報告

#### 院内採用品の切替について

| 採用中止医薬品                 | 切替医薬品                        |  |
|-------------------------|------------------------------|--|
| プランルカストカプセル 112.5mg「DK」 | プランルカストカプセル 112.5mg<br>「サワイ」 |  |
| マルタミン注射用                | オーツカ MV注                     |  |
| プレベナー 13水性懸濁注           | プレベナー 20水性懸濁注                |  |