



# 薬剂委员会结果报告



2025年1月8日 開催

➤ 薬剂マスタ登録: 1月16日予定

# 新規採用申請医薬品(院外採用)

商品名	レキサルティOD錠 0.5mg		
成分名	ブレクスピプラゾール	薬価	128.7円/錠
メーカー	大塚製薬株式会社		
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・統合失調症・うつ病・うつ状態</li> <li>・アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動又は攻撃的言動</li> </ul>		
用法・用量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・統合失調症：1日1回1mgから投与を開始した後、4日以上の間隔をあけて増量し、1日1回2mgを経口投与</li> <li>・うつ病・うつ状態：1日1回1mgを経口投与。なお、忍容性に問題がなく、効果不十分時、1日量2mgに増量可</li> <li>・アルツハイマー型認知症：1日1回0.5mgから投与を開始した後、1週間以上の間隔をあけて増量し、1日1回1mgを経口投与。忍容性に問題がなく、効果不十分時、1日1回2mgに増量可。増量は1週間以上の間隔をあけて行うこと</li> </ul>		
分類	劇薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		PTP・包装写真
粉砕	不可 不可の場合理由：OD錠であるため	分包	可
使用成績調査等対象品目	なし	流通備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項：中等度から重度の肝機能障害のある場合、減量又は投与間隔の延長等を考慮。</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項：重度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス30mL/min未満）のある場合、減量又は投与間隔の延長等を考慮。</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項：なし</li> <li>✓ レセプト上の注意事項：なし</li> <li>✓ その他：なし</li> </ul>		



# 新規採用申請医薬品(院外採用)

商品名	アリドネパッチ 27.5mg		
成分名	ドネペジル	薬価	286.4円
メーカー	製造販売元: 帝国製薬株式会社/販売元: 興和株式会社		
効能・効果	アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制		
用法・用量	軽度～中等度: 1日1回27.5mgを貼付 高度: 27.5mgで4週間以上経過後、55mgに増量(症状により1日1回27.5mgに減量可) 背部、上腕部、胸部のいずれかの正常で健康な皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える		
分類	劇薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		包装写真
使用成績調査等対象品目	なし	流通備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項: なし</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項: なし</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項: なし</li> <li>✓ レセプト上の注意事項: なし</li> <li>✓ その他: なし</li> </ul>		

# 仮採用申請医薬品

商品名	フェスゴ配合皮下注 MA、IN		
成分名	ペルツズマブ、トラスツズマブ、 ボルヒアルロニダーゼアルファ	薬価	MA: 257,938円
メーカー	中外製薬株式会社		IN: 452,686円
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・HER2陽性の乳癌</li> <li>・がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌</li> </ul>		
用法・用量	乳癌/結腸・直腸癌: 初回投与時にはINを8分以上、2回目以降はMAを5分以上かけて3週間間隔で皮下投与 投与が遅れた場合、前回投与日から6週間未満のときには、MA 6週間以上のときには、INを投与する		
分類	抗悪性腫瘍剤	保管条件	2～8℃保存
製剤写真			
	本体写真・包装写真		
使用成績調査 等対象品目	なし	流通 備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:一般名が類似しているトラスツズマブ、ペルツズマブとの取り違えに注意</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li> <li>✓ その他:重篤な心機能障害があらわれることがあるので、本剤投与開始前に必ず心機能を確認すること</li> </ul>		

# 仮採用申請医薬品

商品名	サムチレール内用懸濁液15%		
成分名	アトバコン	薬価	1,471.10円
メーカー	グラクソ・スミスクライン株式会社		
効能・効果	〈適応菌種〉ニューモシスチス・イロベチー 〈適応症〉ニューモシスチス肺炎、ニューモシスチス肺炎の発症抑制		
用法・用量	〈ニューモシスチス肺炎の治療〉通常成人には1回5mLを1日2回21日間、食後に経口投与する。 〈ニューモシスチス肺炎の発症抑制〉通常、成人には1回10mLを1日1回、食後に経口投与する。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		包装写真
使用成績調査等対象品目	なし	流通備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li> <li>✓ その他:本剤は、副作用によりスルファメトキサゾール・トリメプリーム配合剤（ST合剤）の使用が困難な場合に使用すること。本剤を食後に投与できない患者では、代替治療を検討すること。投与開始時及び投与中に下痢が認められている場合には、本剤の吸収が低下し、効果が減弱する可能性がある。</li> </ul>		

# 仮採用申請医薬品

商品名	カナマイシンカプセル 250mg「明治」		
成分名	カナマイシン一硫酸塩	薬価	40円
メーカー	MeijiSeikaファルマ株式会社		
効能・効果	＜適応菌種＞ カナマイシンに感性の大腸菌、赤痢菌、腸炎ビブリオ ＜適応症＞ 感染性腸炎		
用法・用量	通常成人1日2～4g (力価) を4回に分割経口投与する。小児には体重1 kgあたり50～100mg (力価) を4回に分割経口投与する。なお年齢、症状により適宜増減する。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		PTP・包装写真
粉砕	不可 不可の場合理由:吸湿性のため	分包	不可 不可の場合理由:吸湿性のため
使用成績調査等対象品目	なし	流通備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li> <li>✓ その他:なし</li> </ul>		


# 検討事項およびその他の報告

## ① 仮採用薬の削除(取り下げ)について

仮採用削除医薬品
エイベリス点眼液0.002%

## ② 後発品切替について

以下5品目を切替候補とする。

先発品		後発品
レブラミドカプセル5mg		レナリドミドカプセル5mg 「BMSH」
プラケニル錠200mg		ヒロドキシクロロキン硫酸塩錠200 「DSEP」
ハラヴェン静注1mg		エリブリンメシル酸塩静注液1mg 「日医工」
イグザレルト錠10mg		リバーロキサバンOD錠10mg 「バイエル」
イグザレルト錠15mg		リバーロキサバンOD錠15mg 「バイエル」