# 薬剤委員会結果報告

2025年10月1日 開催

➤ 薬剤マスタ登録:10月9日予定

| 商品名             | エブリスディ錠 5mg  |   |                     |  |
|-----------------|--|---|---------------------|--|
| 成分名             | リスジプラム   | <br>薬価  | 73,831.90円/錠        |  |
| メーカー            | 中外製薬株式会社   | <b>未</b> Щ  | 70,001.00[]/ 政C<br> |  |
| 効能・効果           | 脊髄性筋萎縮症  |   |                     |  |
| 用法•用量           | 通常、2歳以上かつ体重20kg以上の患者にはリスジプラムとして、5mgを1日1回食後に経口投与する。 |   |                     |  |
| 分類              | 劇薬   | 保管条件  | 室温保存                |  |
| 製剤写真            |  | 27/37/n5, 27/27/n5, meses 24, meses 24, meses 27/27/n5, meses |                     |  |
|                 | 本体写真   | PTP·包装写真  |                     |  |
| 大力。             | 不可<br>理由:フィルムコーティング錠であるため                          | 分包  | 不可<br>理由:水分量の増加     |  |
| 使用成績調査<br>等対象品目 | なし   | 流通<br>備考  | なし                  |  |

- ✓ 肝機能障害時の注意事項:重度の肝機能障害(Child-Pugh分類c)のある患者ではリスジプラムの血中濃度が上昇するおそれがある。
- ✓ 腎機能障害時の注意事項:なし
- ✓ 薬剤投与時の注意事項:
  - ①経鼻又は胃瘻チューブを介して投与しないこと。
  - ②錠剤をそのまま水で服用することが困難な場合は、少量の常温の水に分散させて服用することができる。 分散に際しては、水以外の液体は使用しないこと。
  - ・水に分散する場合、塩素処理された水を使用しないこと。
  - ・水に分散する場合、本剤の懸濁液は日光に曝さず、用時調製し、10分以内に服用すること。10分を超えた場合は使用せず廃棄すること。
  - ・エブリスディの懸濁液がこぼれたり皮膚に付着したりした場合には石けんと水で十分に洗浄すること。
- ✓ レセプト上の注意事項:SMN1 遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2 遺伝子のコピー数が1以上であることを確認した遺伝子検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。

#### 特記事項

| 商品名             | ジャカビ錠 5mg/10mg  |          |   |
|-----------------|---|----------|---|
| 成分名             | ルキソリチニブリン酸塩   | 薬価       | 5mg:4,176.10円/錠                                     |
| メーカー            | ノバルティスファーマ株式会社  | <b>未</b> | Omg:8,390.20円/錠                                     |
|                 | 骨髄線維症、真性多血症(既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限る)<br>造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(ステロイド剤の投与で効果不十分な場合)  |          |   |
| 用法•用量           | 《骨髄線維症》1回5mg~25mgを1日2回、12時間毎を目安に経口投与。患者の状態により適宜増減する。<br>〈真性多血症〉1回10mgを開始用量とし、1日2回経口投与。適宜増減するが、1回25mg1日2回を超えないこと。<br>〈造血幹細胞移植後の移植片対宿主病〉成人及び12歳以上の小児には1回10mgを1日2回、12時間毎を目安に<br>経口投与する。患者の状態により適宜減量する。 |          |   |
| 分類              | 劇薬  | 保管条件     | 室温保存  |
| 製剤写真            | H'E L10   |          | ジャカビ 5mg<br>シャカビ シャカビ シャカビ シャカビ シャカビ シャカビ コロmg 10mg |
|                 | 本体写真  |          | PTP·包装写真  |
| 粉铧              | 不可<br>理由:抗悪性腫瘍剤   | 分包       | 不可<br>理由:抗悪性腫瘍剤                                     |
| 使用成績調査<br>等対象品目 | なし  | 流通備考     | なし  |

#### 特記事項

- ✓ 肝機能障害時の注意事項:減量を考慮するとともに、患者の状態をより慎重に観察し、有害事象の発現に 十分注意すること。活性代謝物の血中濃度が上昇するとの報告がある。
- ✓ 腎機能障害時の注意事項:減量を考慮するとともに、患者の状態をより慎重に観察し、有害事象の発現に 十分注意すること。未変化体の血中濃度が上昇するとの報告がある。
- ✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし
- ✓ レセプト上の注意事項:なし
- ✓ その他:なし

| 商品名             | タルグレチンカプセル 75mg   |              |  |
|-----------------|---|--------------|--|
| 成分名             | ベキサロテン  | 薬価           | 2,846.70円/カプセル   |
| メーカー            | 株式会社 ミノファーゲン製薬  | <b>*</b> III | 2,040.70  ]/ /J/ E/V   |
| 効能•効果           | 皮膚T細胞性リンパ腫、皮膚病変を有する成と   | 人T細胞白血病リン/   | ₹腫   |
| _ m,_ m ==      | 通常、成人にはベキサロテンとして1日1回300 mg/m2(体表面積)を食後経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 |              |  |
| 分類              | 劇薬  | 保管条件         | 室温保存   |
| 製剤写真            |   | ンカプセル75mg タ  | (Eが要素語) (Eが要 |
|                 | 本体写真  | PTP•包装写真     |  |
| 粉碎              | 不可<br>理由:抗悪性腫瘍剤   | 分包           | 不可<br>理由:抗悪性腫瘍剤  |
| 使用成績調査<br>等対象品目 | なし  | 流通<br>備考     | なし   |

#### 特記事項

- ✓ 肝機能障害時の注意事項:重度の肝障害のある患者には投与禁忌。肝代謝であり、血中濃度が上昇する 恐れがある。
- ✓ 腎機能障害時の注意事項:なし
- ✓ 調剤・調製に関する注意事項:崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性は該当資料なし
- ✓ レセプト上の注意事項:なし
- ✓ その他:催奇形性あり。

| 商品名             | ネイリンカプセル 100mg   |               |   |  |  |
|-----------------|--|---------------|---|--|--|
| 成分名             | ホスラブコナゾール  | 薬価            | 814.8円/カプセル   |  |  |
| メーカー            | 佐藤製薬   | <del>*</del>  |   |  |  |
| 効能∙効果           | 適応菌種:皮膚糸状菌(トリコフィトン属)<br>適応症:爪白癬  |               |   |  |  |
| 用法·用量           | 通常、成人には1日1回1カプセル(ラブコナゾー  | -ルとして100mg)を1 | 2週間経口投与する。  |  |  |
| 分類              | 普通薬  | 保管条件          | 室温保存  |  |  |
| 製剤写真            | SATO<br>18   |               | Poly representative and property of the polymer of |  |  |
|                 | 本体写真   | PTP•包装写真      |   |  |  |
| 粉铧              | 不可<br>理由:脱カプセル1週間で水分不適合  | 分包            | 不可<br>理由:湿度条件下では性状の変化、水分の増加及び含<br>量の低下あり。光条件下では性状の変化あり  |  |  |
| 使用成績調査<br>等対象品目 | なし   | 流通<br>備考      |   |  |  |
| 特記事項            | <ul><li>✓ 肝機能障害時の注意事項:臨床試験において肝機能検査値異常が認められている</li><li>✓ 腎機能障害時の注意事項:なし</li><li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li><li>✓ その他:妊婦又は妊娠している可能性のある患者は禁忌。</li></ul> |               |   |  |  |

| 商品名    | アドトラーザ皮下注300mgペン  |              |  |
|--------|---|--------------|--|
| 成分名    | トラロキヌマブ   | · 大工         | 44.0F0 TT / <del></del>  |
| メーカー   | レオファーマ株式会社  | 薬価           | 41,859円/本  |
|        | 既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎   | <u>L</u>     |  |
|        | 通常、成人にはトラロキヌマブ(遺伝子組換え)  | として初回に 600 n | ng を皮下投与し、   |
|        | その後は 1 回 300 mg を 2 週間隔で皮下投与  |              |  |
|        |   |              |  |
| 分類     | 劇薬  | 保管条件         | 凍結を避け、2~8℃にて保存   |
| 製剤写真   | プトトラーザ ara<br>Jong つ  |              | THE THE STATE OF T |
|        | 本体写真  | PTP•包装写真     |  |
| 使用成績調査 | <i>+</i> >1   | 流通           | なし   |
| 等対象品目  | <b>/</b> よし   | 備考           | / <b>4</b> C   |
|        | <ul><li>✓ 肝機能障害時の注意事項:なし</li><li>✓ 腎機能障害時の注意事項:なし</li></ul>                   |              |  |
| 特記事項   | <ul><li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし</li><li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li><li>✓ その他:なし</li></ul> |              |  |

## 仮採用申請医薬品

| 商品名          | プロウペス腟用剤10mg  |               |  |  |
|--------------|---|---------------|--|--|
| 成分名          | ジノプロストン   | 薬価            | 薬価基準未収載  |  |
| メーカー         | 富士製薬工業株式会社  | <del>米</del>  |  |  |
| 効能•効果        | 妊娠37週以降の子宮頸管熟化不全における素   | 熟化不全における熟化の促進 |  |  |
| 用法•用量        | 本剤1個を後腟円蓋に挿入し、最長12時間腟内に留置する。  |               |  |  |
| 分類           | 劇薬  | 保管条件          | -20℃以下   |  |
| 製剤写真         |   |               | Action of the second of the se |  |
|              | 本体写真  | PTP·包装写真      |  |  |
| 使用成績調査 等対象品目 | なし(終了)  | 流通<br>備考      | なし   |  |
|              | <ul><li>✓ 肝機能障害時の注意事項:なし</li><li>✓ 腎機能障害時の注意事項:なし</li></ul>                                 |               |  |  |
| 特記事項         | <ul><li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし</li><li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li><li>✓ その他:納入に際して、医師・助産師のeラ</li></ul> | ーニングの受講が      | 必要   |  |

## 製造中止•回収•出荷調整等情報

| 医薬品名          | 【内容】理由     | 今後の対応                           |
|---------------|------------|---------------------------------|
|               | 投目が見るのだいため | 継続処方例について一般名処方への変更<br>を該当医師に連絡済 |
| (院外) フルナーゼ点鼻液 |            | 継続処方例について代替薬への変更を該<br>当医師に連絡済   |

### 検討事項およびその他の報告

### 院内採用薬の切替について

|             | 現行                      | 変更                        |
|-------------|-------------------------|---------------------------|
|             | ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」   | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」    |
|             | エスゾピクロン錠1mg「トーワ」        | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」         |
| 内           | エスゾピクロン錠2mg「トーワ」        | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」         |
| 内服薬         | カペシタビン錠300mg「NK」        | カペシタビン錠300mg「サワイ」         |
|             | フルコナゾールカプセル100mg「アメル」   | フルコナゾールカプセル100mg「JG」      |
|             | モビコール配合内用剤HD(EAファーマ)    | モビコール配合内用剤HD (持田製薬)       |
|             | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」       |
| 外           | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」   | ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」 |
| 外<br>用<br>薬 |                         |                           |