

# 薬剤委員会結果報告

2025年12月3日 開催

- 薬剤マスタ登録: 12月11日予定

# 院外採用申請医薬品

商品名	ビンマックカプセル61mg		
成分名 メーカー	タファミジス ファイザー株式会社	薬価	35,983.70円／カプセル
効能・効果	トランスサイレチン型心アミロイドーシス(野生型及び変異型)		
用法・用量	通常、成人にはタファミジスとして1回61mgを1日1回経口投与する。		
分類	劇薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
粉碎	不可 不可の場合理由:データなし	分包	不可 不可の場合理由:データなし
使用成績調査等対象品目	特定使用成績調査実施中(症例集積終了)	流通備考	なし

# 院外採用申請医薬品

✓ 肝機能障害時の注意事項:

9.3.1 重度の肝機能障害患者

重度の肝機能障害患者を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

✓ 腎機能障害時の注意事項:設定されていない

✓ 調剤・調製に関する注意事項:該当しない

✓ レセプト上の注意事項:

①本製剤の効能又は効果に関する注意において、「本剤の適用にあたっては、最新のガイドライン等を参考し、トランスサイレチンアミロイドーシスの診断が確定していることを確認すること。」とされているので、日本循環器学会の最新のガイドライン等に従い、トランスサイレチンアミロイドーシスの診断及び治療に精通した医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用すること。

本製剤の投与開始に当たっては、次の要件にすべて該当する旨及びTTR遺伝子検査で病的変異の有無を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 心不全による入院歴又は利尿薬の投与を含む治療を必要とする心不全症状を有すること

イ 心エコーによる拡張末期の心室中隔厚が12mmを超えること

ウ 病理検査所見又はシンチグラフィに関する日本循環器学会の最新のガイドライン等の要件を満たすこと

②本製剤の効能又は効果に関する注意において、「NYHA心機能分類Ⅲ度の患者では、NYHA心機能分類I・Ⅱ度の患者より相対的に本剤の有効性が低い可能性があるので、本剤の作用機序、及び臨床試験で示唆されたNYHA心機能分類と有効性の関係を十分に理解し、患者の状態を考慮した上で、本剤投与の要否を判断すること。」及び「NYHA心機能分類Ⅳ度の患者における有効性及び安全性は確立していない。」とされているので、使用に当たっては十分留意し、本製剤の初回投与に当たっては、NYHA心機能分類I～Ⅲ度の患者を対象とすること。

✓ その他:なし

特記事項

# 院外採用申請医薬品

商品名	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒(3.75g/包) KB-49		
成分名	日局ニンジン3.0g, 日局ビヤクジュツ3.0g, 日局ブク リョウ3.0g, 日局オウギ2.0g, 日局トウキ2.0g, 日局オ ンジ1.5g, 日局サイコ3.0g, 日局サンシシ2.0g, 日局力 ンゾウ1.0g, 日局モッコウ1.0g, 日局タイソウ1.5g, 日局 ショウキヨウ0.5g, 日局サンソウニン3.0g, 日局リュウ ガンニク3.0g  上記混合生薬により抽出した日局加味帰脾湯エキ ス5,600mgを含有する。	薬価	25.50円/g
メーカー	クラシエ薬品株式会社		
効能・効果	虚弱体质で血色の悪い人の次の諸症:貧血、不眠症、精神不安、神経症		
用法・用量	通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
使用成績調査 等対象品目	なし	流通 備考	なし

# 院外採用申請医薬品

- ✓ 肝機能障害時の注意事項:なし
- ✓ 腎機能障害時の注意事項:なし
- ✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし
- ✓ レセプト上の注意事項:なし
- ✓ その他:

## 特記事項

本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意すること。

サンシシ含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合にあっては、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。

他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

# 院外採用申請医薬品

商品名	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3.75g/包) KB-83		
成分名	日局ハンゲ5.0g, 日局ビヤクジュツ4.0g, 日局ブクリヨウ4.0g, 日局センキュウ3.0g, 日局チンピ 3.0g, 日局トウキ3.0g, 日局サイコ2.0g, 日局カンゾウ1.5g, 日局チョウトウコウ3.0g 上記混合生薬により抽出した日局抑肝散加陳皮半夏エキス5,000mgを含有する。	薬価	16.70円/g
メーカー	クラシエ薬品株式会社		
効能・効果	虚弱な体质で神経がたかぶるもの次の諸症: 神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症		
用法・用量	通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
使用成績調査等対象品目	なし	流通備考	なし

# 院外採用申請医薬品

## 特記事項

- ✓ 肝機能障害時の注意事項:なし
- ✓ 腎機能障害時の注意事項:なし
- ✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし
- ✓ レセプト上の注意事項:なし
- ✓ その他:本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。  
本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意すること。  
他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

# 仮採用申請医薬品

商品名	ブリィビアクト錠25mg		
成分名	ブリーバラセタム	薬価	373.30円/錠
メーカー	ユーシービージャパン株式会社		
効能・効果	てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)		
用法・用量	通常、成人にはブリーバラセタムとして1日50mgを1日2回に分けて経口投与する。なお、症状により1日200mgを超えない範囲で適宜増減できる。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真	 	PTP・包装写真	
粉碎	可	分包	可
使用成績調査等対象品目	なし	流通備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:Child-Pugh分類A、B及びCでは本剤の血中濃度が上昇することがある</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:「特定の背景を有する患者に関する注意(2)腎機能障害患者」は設定なし</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li> <li>✓ その他:なし</li> </ul>		

## 検討事項およびその他の報告

### 院内採用品の切替について

採用中止医薬品	切替医薬品
ドパストンカプセル250mg	ドパストン散 98.5%
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	グリメピリドOD錠1mg「日医工」
テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」	テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」
バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	バルサルタン錠40mg「サンド」
ビカルタミドOD錠80mg「トーワ」	ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」

# 検討事項およびその他の報告

## 院内採用品の規格の追加について

医薬品名	ポビドンヨードゲル10% 4gチューブ製剤 (3.2円/g) (採用:イソジンゲル90g 4.2円/g)
理由	術中の頭蓋骨固定ピンを抜去した創部に塗布に同成分のイソジンゲル10% 90gのチューブ入り製剤を使用している。1回の手術に10g程度の使用であり、90g製剤をすべて使用できずに廃棄している。4g製剤が販売されており廃棄コスト削減が可能である。4g製剤のため用途はその他もあると考えられる。