薬剤委員会結果報告


2026年10月7日 開催

- 薬剤マスタ登録：10月15日予定

採用申請医薬品

商品名	アラグリオ内用剤1.5g		
成分名 メーカー	アミノレブリン酸塩酸塩 日本化薬株式会社	薬価	75,985.9円/瓶
効能・効果	経尿道的膀胱腫瘍切除術時における筋層非浸潤性膀胱癌の可視化		
用法・用量	アミノレブリン酸塩酸塩として20mg/ kgを、膀胱鏡挿入2～8時間前に、水に溶解して経口投与する。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
使用成績調査等対象品目	なし	流通 備考	代替削除品：エビプロスタットDB配合錠
特記事項	✓ 肝機能障害時の注意事項：肝機能障害のある患者を対象とした臨床試験は実施していない ✓ 腎機能障害時の注意事項：腎機能障害のある患者を対象とした臨床試験は実施していない ✓ 調剤・調製に関する注意事項：なし ✓ レセプト上の注意事項：なし ✓ その他：なし		

採用申請医薬品

商品名	ケレンディア錠10mg、20mg		
成分名 メーカー	フィネレノン バイエル薬品株式会社	薬価	10mg：142.2円／錠 20mg：203.4円／錠
効能・効果	○2型糖尿病を合併する慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。 ○慢性心不全 ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患 者に限る。		
用法・用量	**〈2型糖尿病を合併する慢性腎臓病〉** 成人にはフィネレノンとして以下の用量を1日1回経口投与する。eGFRが60mL/min/1.73m2以上：20mg eGFRが60mL/min/1.73m2未満：10mgから投与を開始し、血清カリウム値、eGFRに応 じて、投与開始から4週間後を目安に20mgへ増量する。 **〈慢性心不全〉** 成人にはフィネレノンとして以下の用量を1日1回経口投与する。 eGFRが60mL/min/1.73m2以上：20mgから投与を開始し、血清カリウム値、eGFRに応 じて、投与開始から4週間後を目安に40mgへ増量する。 eGFRが25mL/min/1.73m2以上60mL/min/1.73m2未満：10mgから投与を開始し、血清カリ ウム値、eGFRに応じて、投与開始から4週間後を目安に20mgへ増量する。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	


採用申請医薬品

粉砕	不可 不可の場合理由：光で分解	分包	可
使用成績調査等対象品目	なし	流通 備考	代替削除：サルポグレラート錠100mg「サンド」
特記事項	✓肝機能障害時の注意事項：中等度～重度の肝機能障害のある患者さんでは本剤の血中濃度が上昇し、それに伴って血清カリウム値が上昇するおそれがある ・重度（Child-Pugh分類C）の肝機能障害がある患者さんには投与しない（投与禁忌） ・中等度の肝機能障害（Child-Pugh分類B）のある患者さんに投与する際には、状態に応じてより頻回に血清カリウム値を測定する ✓腎機能障害時の注意事項： 【2型糖尿病を合併する慢性腎臓病】 末期腎不全又は透析施行中の患者さんには投与しない。 本剤投与によりeGFRが低下することがあることから、eGFRが25mL/min/1.73m2未満の患者さんには投与の適否を慎重に判断する。また、本剤投与中に末期腎不全又は透析に至った場合は投与を中止する。 【慢性心不全】 本剤投与開始時に重度の腎機能障害（eGFR25mL/ min/1.73m2 未満）のある患者は禁忌。 ✓調剤・調製に関する注意事項：飲み忘れた際は、気がついた時に、1回分を服用。2回分を一度に飲まない。服用する時間帯や食事のタイミングの制限はなし ✓レセプト上の注意事項：【慢性心不全】投与開始にあたっては、左室駆出率の計測年月日及び左室駆出率の値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。（留意事項通知書参照） ✓その他：10mg錠と20mg錠の生物学的同等性は示されていないため、20mg又は40mgを投与する際には10mg錠を使用しないこと。（IF　P13参照）		

院外採用申請医薬品

商品名	サフネロー皮下注120mgオートインジェクター		
成分名 メーカー	アニフロルマブ アストラゼネカ株式会社	薬価	24,932円
効能・効果	既存治療で効果不十分な全身性エリテマトーデス		
用法・用量	1回120mgを1週間ごとに皮下注射		
分類	ヒト抗I型インターフェロン受容体1モノクローナル抗体 劇薬	保管条件	冷所保存
製剤写真	 本体写真		
使用成績調査等対象品目	なし	流通 備考	なし
特記事項	✓ 肝機能障害時の注意事項：設定されていない ✓ 腎機能障害時の注意事項：設定されていない ✓ 調剤・調製に関する注意事項：なし ✓ レセプト上の注意事項：なし ✓ その他：在宅自己注射管理指導料　対象薬剤		

院外採用申請医薬品

商品名	セタネオ点眼液0.002%		
成分名 メーカー	セペタプロスト 参天製薬株式会社	薬価	800.00円／mL(2,000円/2.5mL/本)
効能・効果	緑内障、高眼圧症		
用法・用量	1回1滴、1日1回点眼する。		
分類	二環式プロスタグランジン誘導体 普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	包装写真	
使用成績調査等 対象品目	市販直後調査：実施（販売開始後6ヵ月間）	流通 備考	特になし
特記事項	・肝機能障害時の注意事項：設定されていない（肝機能障害患者での薬物動態は該当資料なし） ・腎機能障害時の注意事項：設定されていない（腎機能障害患者での薬物動態は該当資料なし） ・調剤・調製に関する注意事項：他の点眼剤を併用する場合は、少なくとも5分以上間隔をあける。ソフトコンタクトレンズは点眼前に外し、点眼後5～10分あけて再装用する。 ・レセプト上の注意事項：なし ・その他：2026年10月末日までは1回14日分を限度。		

院外採用申請医薬品

商品名	リットフーロカプセル50mg		
成分名 メーカー	リトレシチニブトシル酸塩 ファイザー株式会社	薬価	5,584.30円/カプセル
効能・効果	円形脱毛症患者（ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る）		
用法・用量	成人及び 12 歳以上の小児には、リトレシチニブとして 50mg を 1 日 1 回経口投与する。		
分類	JAK3/TECファミリーキナーゼ阻害剤 劇薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
粉砕	**不可** 不可の場合理由：データなし	分包	不可 不可の場合理由：データなし
使用成績調査等対象品目	特定使用成績調査（長期）実施中	流通 備考	**なし**
特記事項	✓ **肝機能障害時の注意事項：重度の肝機能障害（Child Pugh 分類 C）のある患者に投与しないこと。重度の肝機能障害患者を対象とした臨床試験は実施していない。** ✓ **腎機能障害時の注意事項：なし。** ✓ **調剤・調製に関する注意事項：リットフーロカプセルを脱カプセルした際の安定性について検討したデータ、簡易懸濁法における崩壊懸濁試験や通過性試験のデータ、及び一包化した際の安定性について検討したデータなし** ✓ **レセプト上の注意事項：レセプト摘要欄への必須記載事項あり。①頭部全体に占める脱毛部位割合。②毛髪の自然再生が認められていない期間** ✓ **その他：なし**		

仮採用申請医薬品

商品名	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）		
成分名 メーカー	治打撲一方 ツムラ	薬価	8.3円/g　1日薬価：62.25円（7.5g）
効能・効果	打撲によるはれ及び痛み		
用法・用量	1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
使用成績調査等対象品目	なし	流通 備考	なし
特記事項	✓ 肝機能障害時の注意事項：安全性および有効性を指標とした臨床試験は実施していない ✓ 腎機能障害時の注意事項：安全性および有効性を指標とした臨床試験は実施していない ✓ 調剤・調製に関する注意事項：開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること ✓ レセプト上の注意事項：なし ✓ その他：添付文書の重要な基本的注意に記載		

仮採用申請医薬品

商品名	ビクタルビ配合錠		
成分名 メーカー	ビクテグラビルナトリウム　エムトリシタビン　テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩 ギリアド・サイエンシズ（株）	薬価	7,094.10円／1錠
効能・効果	HIV-1 感染症		
用法・用量	1回1錠を1日1回経口投与		
分類	抗ウイルス化学療法剤 劇薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
粉砕	不可 不可の場合理由：データなし	分包	可
使用成績調査等対象品目	なし	流通 備考	
特記事項	✓ 肝機能障害時の注意事項：重度の肝機能障害患者を対象とした臨床試験は実施していない。 ✓ 腎機能障害時の注意事項：クレアチニンクリアランスが30mL/分未満に低下した場合は、維持血液透析を行っている患者を除き、投与の中止を考慮 ✓ 調剤・調製に関する注意事項：乾燥剤入りPTP包装で保管 ✓ レセプト上の注意事項：なし ✓ その他：なし		

仮採用申請医薬品

商品名	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）		
成分名 メーカー	人参養栄湯 ツムラ	薬価	20円/g　1日薬価：180g（9.0g）
効能・効果	病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血		
用法・用量	通常、成人1日9.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
使用成績調査等対象品目	なし	流通 備考	なし
特記事項	✓ 肝機能障害時の注意事項：安全性および有効性を指標とした臨床試験は実施していない ✓ 腎機能障害時の注意事項：安全性および有効性を指標とした臨床試験は実施していない ✓ 調剤・調製に関する注意事項：開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること ✓ レセプト上の注意事項：なし ✓ その他：本剤の投与により、血中AG（1,5-アンヒドロ-D-グルシトール）が増加する場合がある。		

仮採用薬品取り下げ

	仮採用医薬品
①	メソトレキセート点滴静注液1000mg
②	アクラシノン注20mg
③	エジャイモ点滴静注1.1mg
④	リブロファズ配合皮下注

製造中止・回収・出荷調整等情報 ①

医薬品名	【内容】理由	今後の対応
モビコール配合内用剤HD	【限定出荷、その後出荷停止】 海外製造所において品質システムに関する指摘を受け、当該製造所で品質マネジメントシステムの強化および是正措置を実施し、製造および出荷を一時停止している。結果安定供給の継続が困難であるため。 限定出荷期間：2026年11月まで 一時出荷停止期間：2026年12月～2027年6月	【院内採用の同効薬】 ・リンゼス錠0.25mg ・アミティーザカプセル24μg 【院外採用の同効薬】 ・グーフィス錠5mg 院外処方のマスター時停止
(院外) ノルスパンテープ	【限定出荷及び供給停止】 日本向け割当数量が当初計画 を下回り、輸入数量の減少、安全在庫の確保が困難となった。さらに輸入関連手続きの遅延が発生、製品の在庫積み上げが十分に行えなくなったため 限定出荷期間：2026年9月 4日～9月18日 供給停止期間：2026年9月24日～2026年10月30日の予定	・関連診療科へ報告済

検討事項およびその他の報告

① 院内採用品の切替について

採用中止医薬品	切替医薬品	理由
センノシド錠 12mg「サンド」	センノシド錠 12mg「サワイ」	販売中止のため供給可能なメーカーへ変更
ロスバスタチンOD錠 2.5mg「サワイ」	ロスバスタチンOD錠 2.5mg「日医工」	販売中止のため供給可能なメーカーへ変更
ポピヨドンスクラブ7.5%	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	販売中止のため供給可能なメーカーへ変更

検討事項およびその他の報告

②後発品切替について

関係診療科へ切替候補薬について調査を実施した結果、以下の品目を切替候補とする。

	一般名	先発品	薬価	**後発品**	薬価	AG（※）	適応相違
1	プラスグレル塩酸塩	エフィエントOD錠20mg	949.6	**プラスグレルOD錠20mg「トーワ」**	471.2	○	なし
2	プラスグレル塩酸塩	エフィエント錠3.75mg	237.0	**プラスグレル錠3.75mg「トーワ」**	118.2	○	なし

	一般名	先発品	薬価	**後発品**	薬価	AG（※）	適応相違
1	ビラスチン	ビラノアOD錠20mg	44.8	**ビラスチンOD錠「EP」**	17.7	○	なし